

007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from  
optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or  
enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Abstract (Basic): JP 61280295 A

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of  
formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive  
optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is  
(substd.) alkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl,  
arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N  
atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd.  
from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl  
substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important  
intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having  
antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria  
yeast and fungi. Bacteria include *Arthrobacter simplex* SANK 73560 (IAM  
1660), *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069), *Chromobacterium violaceum*  
SANK 72783 (ATCC 31532), *Flavobacterium capsulatum* SANK 70979 (IFO 12533),  
and *Flavobacterium meningosepticum* SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes  
*Aureobacidium pullurans* SANK 10877 (ATCC 15232), *Candida albicans* SANK  
50169 (IFO 0683), *Pichia farinosa* SANK 58062 (LAM 4303), *Pichia terricola*  
SANK 51684 (FERM 8001), *Rhodotorula minuta* SANK 50871 (IFO 0932), and  
*Saccharomyces cerevisiae* SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes *Aspergillus*  
*niger* SANK 13658 (ATCC 9142) *Gliocladium roseum* SANK 10560 (FERM 8259),  
and *Humicola asteroidea* SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,



⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭61-280295

⑬ Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)12月10日

C 12 P 41/00  
 //(C 12 P 41/00  
 C 12 R 1:01)  
 (C 12 P 41/00  
 C 12 R 1:645)

7823-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

⑮ 発明の名称 光学活性アゼチジノン誘導体の製法

⑯ 特 願 昭60-121479

⑰ 出 願 昭60(1985)6月6日

⑱ 発 明 者	平 井 功 一	東京都品川区広町1丁目2番58号	三井株式会社内
⑲ 発 明 者	岩 野 雄 次	東京都品川区広町1丁目2番58号	三井株式会社内
⑲ 発 明 者	内 藤 敦	東京都品川区広町1丁目2番58号	三井株式会社内
⑲ 発 明 者	宮 越 俊 一	東京都品川区広町1丁目2番58号	三井株式会社内
⑳ 出 願 人	三 共 株 式 会 社	東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6	
㉑ 代 理 人	弁理士 櫻 出 庄 治		


# 明 細 書

## 1. 発明の名称

光学活性アゼチジノン誘導体の製法


## 2. 特許請求の範囲

一般式



(I)

〔式中、R<sup>1</sup>は置換基を有してもよいアシル基、を示し、R<sup>2</sup>は置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アリールチオ基、もしくはアリールスルホニル基、またはアシルオキシ基を、R<sup>3</sup>は水素原子または置換基原子の保護基を示す。〕を有する化合物 (dl 体) を微生物又は酵素を利用して選択的に加水分解し一般式



(II)

〔式中、R<sup>2</sup>およびR<sup>3</sup>は前述したものと同意義を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くことを特徴とするβ-ラクタム化合物の製法。

## 3. 発明の詳細な説明


本発明は光学不活性な3-(1-アシルオキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体 (dl 体) を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体は抗菌活性を有するカルバペネム及びペネム誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体の製法に関しては種々知られているが、いずれも工程数が多く反応操作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られるdl-3-(1-アシルオキシエチル)-2-アゼチジノン (I) を微生物ないしは酵素を利用して選択的に加水分解し光学活性な3-(1-ヒ

ドロキシエチル) - 2 - アセチジノン (2) が効率よく得られることを見出し本発明を完成した。

一般式



に於ける R¹ は置換基を有しても良いアシル基〔たとえばホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリルもしくはベンゾイル基であつて以下に示す同一もしくは異なる置換基を 1 ~ 3 個有してもよい。その置換基はアルキル (メチル、エチル、プロピルなど) アルコキシ (メトキシ、エトキシなど)、ハロゲン (塩素、臭素など)、ニトロ基であり、R² は、置換基を有してもよいアルキル基〔たとえばメチル、エチル、プロピル、もしくはブチル基であつて以下に示す同一もしくは異なる置換基を 1 ~ 3 個有してもよい。その置換基は、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなどである。)、CO₂R⁴ 基 (式

中 R⁴ は前述したものと同意義を示す。)、-SR⁴ (式中、R⁴ は前述したものと同意義を示す。)、-CONR⁶R⁷ (式中、R⁶ および R⁷ は、同一もしくは異なる水素原子、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、もしくはヒープチルなど)、シクロヘキシル、もしくはベンジルなどである。)-OR⁸ 基 (式中、R⁸ は、水素原子、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルなど) もしくはアシル基 (たとえばアセチル、プロピオニル、ブチリル、もしくはベンゾイルなど) などである)、もしくは -OOR⁹ 基 (式中、R⁹ はメチル、エチル、もしくはフェニルなどである)、などである〕、置換基を有してもよいアルケニル基〔たとえばビニル、アリル、もしくはブテニルであつて以下に示す同一もしくは異なる置換基を 1 ~ 3 個有してもよい。その置換基は、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなど)、-CO₂R⁴ 基 (式中 R⁴ は前述したものと同意義を示す)、-OOR⁵ 基 (式中 R⁵ は、

中 R⁴ は、水素原子、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなどである。)。置換基を有してもよいフェニル基 (その置換基は、メチル、エチル、プロピル、メトキシ、メチルメルカプト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗素、塩素もしくは臭素などである。)、もしくは置換基を有してもよいベンジル基 (その置換基は、メトキシ、メチルメルカプト、メチル、エチル、プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗素、塩素もしくは臭素などである。) などである。)、ハロゲン原子 (たとえば、弗素、塩素、もしくは臭素などである。)、-OOR⁵ 基 (式中、R⁵ は、アルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピルなどである。)、置換基を有してもよいフェニル基 (その置換基は、先に述べた R⁴ が置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同意義を示す。)、もしくは置換基を有してもよいベンジル基 (その置換基は、先に述べた R⁴ が置換基を有してもよいベンジル基の置換基と同

前述したものと同意義を示す)、-SR⁴ 基 (式中 R⁴ は、前述したものと同意義を示す。)、-OR⁸ 基 (式中 R⁸ は、前述したものと同意義を示す。)、もしくは置換基を有してもよいフェニル基 (その置換基は、先に述べた R⁴ が置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同意義を示す) などである〕、置換基を有してもよいアルキニル基〔たとえばエチニル、もしくはプロパルギル基であつて以下に示す同一もしくは異なる置換基を 1 ~ 3 個有してもよい。その置換基はアルキル基 (たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなど)、-CO₂R⁴ 基 (式中 R⁴ は、前述した R⁴ と同意義を示す)、-OOR⁵ 基 (式中 R⁵ は、前述した R⁵ と同意義を示す。)、-SR⁴ 基 (式中 R⁴ は、前述した R⁴ と同意義を示す。)-OR⁸ 基 (式中 R⁸ は、前述した R⁸ と同意義を示す。)、もしくは置換基を有してもよいフェニル基 (その置換基は、先に述べた R⁴ が置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同意義を示す) などである〕、置換基を

有してもよいフェニル基（以下に示す同一もしくは異なる置換基を1～3個有してもよい。その置換基は、アルキル基（たとえばメチル、エチル、プロピル、もしくはイソプロピルなど）、アルコキシ基（たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、もしくはヒープトキシなど）、ハロゲン（たとえば弗素、塩素、もしくは臭素など）、ニトロ、シアノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水酸基などである）、アルキルチオ基  $-SR^9$ （式中  $R^9$  は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなど）、アルキルスルホニル基  $-SO_2R^9$ （式中  $R^9$  は、前述した  $R^9$  と同意義を示す。）、置換基を有してもよいフェニルチオ基（以下に示す同一もしくは異なる置換基を1～3個有してもよい。その置換基は、アルキル基（たとえばメチル、エチル、プロピル、もしくはイソプロピルなど）、アルコキシ基（たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、もしくはヒープトキシなど）、ハロゲン（たとえば弗

素、塩素、もしくは臭素など）、ニトロ、シアノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水酸基などである。）、置換基を有してもよいフェニルスルホニル基（その置換基は、上述した置換基を有してもよいフェニルチオ基の置換基と同意義を示す。）、またはアシルオキシ基、 $-OOR^{10}$ （式中  $R^{10}$  は、炭素数1～10個の置換基を有してもよいアルキル基（たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど）、その置換基は炭素数1～5個のアルキル基（たとえば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、イソプロピル、もしくはヒープチルなど）、置換基を有してもよいフェニル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同意義を示す。）、もしくは置換基を有してもよいベンジル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいベンジル基の置換基と同意義を示す。）などである。）などである。

$R^3$  は、水素原子または窒素原子の保護基（たとえばシリル基（たとえばトリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリル、ヒープチルジメチルシリル、もしくはヒープトキシジフェニルシリルなど）、置換基を有してもよいアルキル基（たとえばメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、もしくはヒープチルなどであつて、以下に示す同一もしくは異なる置換基を1～3個有してもよい。その置換基は、アルキル基（たとえば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、もしくはヒープチルなど）、 $CO_2R^4$  基（式中  $R^4$  は、前述したものと同意義を示す）、 $-OR^{11}$  基（式中  $R^{11}$  は水素原子、アルキル基（たとえばメチル、エチル、プロピル、もしくはブチルなど）、置換基を有してもよいベンジル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいベンジル基の置換基と同意義を示す。）などである。）、置換基を有してもよいフェニル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいフェ

ニル基の置換基と同意義を示す。）、もしくは置換基を有してもよいベンジル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいベンジル基の置換基と同意義を示す。）、置換基を有してもよいアルケニル基（たとえば、ビニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す同一もしくは異なる1～3個の置換基を有してもよい。その置換基は、アルキル基（たとえば、メチル、エチル、プロピル、もしくはブチルなど）、置換基を有してもよいフェニル基（その置換基は先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同意義を示す。）、もしくは  $-CO_2R^4$  基（式中  $R^4$  は、前述したものと同意義を示す。）、置換基を有してもよいフェニル基、（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有していてもよいフェニル基の置換基と同意義であつて、同一もしくは異なる1～3個のこれらの置換基を有してもよい。）、置換基を有してもよいベンジル基（その置換基は、先に述べた  $R^4$  が置換基を有してもよいベンジル基の置

換基と同意義であつて、同一もしくは異なる1～3個のこれらの置換基を有してもよい。)、もしくは置換基を有してもよいシクロアルキル基(たとえばシクロペンチル、もしくはシクロヘキシルなどであつて、その置換基は先述した $R^3$ が窒素原子の保護基である場合の置換基を有してもよいアルキル基の置換基と同意義を示す)などである)などである。

一般式(I)を有する化合物のうち好適化合物は $R^1$ が置換基を有してもよいアシル基(たとえばホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリルないしは、ベンゾイル基であつて以下に示す同一もしくは異なる置換基を1～3個有してもよい。その置換基はアルキル(メチル、エチル)、アルキルオキシ(メチルオキシ、エチルオキシ)、ハロゲン原子(塩素、臭素)などである)、であり、 $R^2$ は置換基を有するアルキル基であつてその置換基は $-OO_2R^4$ 基(式中、 $R^4$ は前述したものと同意義を示す)もしくは $-OOR^5$ 基(式中、 $R^5$ は前述したものと同意義を示す。)、置換基

を有してもよいアルキル基であつて、その置換基は $-SR^4$ 基(式中、 $R^4$ は前述したものと同意義を示す。))もしくは $OR^8$ 基(式中 $R^8$ は、前述したものと同意義を示す。)、アルキルスルホン基 $-SO_2R^9$ (式中、 $R^9$ は前述したものと同意義を示す)、置換基を有してもよいフェニルスルホン基、もしくはアシルオキシ基 $-OOR^{10}$ (式中、 $R^{10}$ は前述したものと同意義を示す。))などであり、 $R^3$ が水素原子、置換基を有するアルキル基であつてその置換基が $-OO_2R^4$ 基(式中、 $R^4$ は前述したものと同意義を示す。)、アルキル基、もしくは $OR^{11}$ 基(式中、 $R^{11}$ は前述したものと同意義を示す。)、置換基を有してもよいアルケニル基であつてその置換基はアルキル基、もしくは $-OO_2R^4$ 基(式中 $R^4$ は前述したものと同意義を示す)、置換基を有してもよいフェニル基、もしくは置換基を有してもよいベンジル基などである。

本発明の不斉加水分解に供試される微生物ないし酵素は、数多い成書と経験とにより選ぶこ

とができる。

この目的達成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のごとくである。

#### [細菌]

*Arthrobacter simplex* SANK 73560 (IAM 1680)  
*Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069)  
*Chromobacterium violaceum* SANK 72783 (ATCC 31532)  
*Flavobacterium capsulatum* SANK 70979 (IFO 12533)  
*Flavobacterium meningosepticum* SANK 70779 (IFO 12535)

#### [酵母]

*Aureobaculum pullurans* SANK 10877 (ATCC 15232)  
*Candida albicans* SANK 50169 (IFO 0683)  
*Pichia farinosa* SANK 58062 (IAM 4303)  
*Pichia terricola* SANK 51684 (FERM 8001)  
*Rhodotorula minuta* SANK 50871 (IFO 0932)  
*Saccharomyces cerevisiae* SANK 50161 (IAM 4512)

#### [糸状菌]

*Aspergillus niger* SANK 13658 (ATCC 9142)  
*Gliocladium roseum* SANK 10560 (FERM 8259)

#### *Humicola asteroida* SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、次に示すA法およびB法に大別できる。

A法—供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、1～2日間培養(通常は回転振とう培養—往復振とう培養でも可—)の後、旺盛な発育のみられる時期に20～150mg%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒0.5～20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

例えば、グルコース2%、ポリペプトン1%、酵母エキス0.1%の各濃度で水道水100mlに溶かし、500ml三角フラスコに分注し、120℃、15lbs、にて20分間高圧殺菌する。冷却後、菌を同一培地で3日間培養した培養液を3ml接種し、28℃にて回転振とうする。1日後、旺盛な生育のみられる時期に、基質を適当量、適当な水溶性溶媒に溶かした液を加え、2日間培養を続け

る。微生物反応終了時のpHは細菌でpH 7.8~8.9、酵母あるいは糸状菌でpH 4.8~5.7である。培養液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

B法—供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、2~4日間培養（通常回転振とう培養—往復振とう培養でも可—）し、菌体を遠心集菌後、生理食塩水で2回洗浄する。こうして得た湿菌体1~5gを、1~5%の水道水溶液に懸濁させ、0.5~2時間回転振とう機（あるいは往復振とう機）にかけて馴化させた後、A法と同様に基質を添加し、同一条件下で加水分解を終了させる、いわゆる菌体懸濁法である。ここでは水道水のかわりに、蒸留水やpH 5.0~7.0の緩衝液、例えば磷酸緩衝液を用いても同様の結果が得られる。

なお、A法における接種菌体、B法における湿菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、例えば市販されている製パン用イーストなどは、目的達成のために手軽に供試しうるものである。

B法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

いて、菌体懸濁液から来る夾雑物がA法に比べて少なく、従つて目的物質の単離、精製が容易であり、かつ収率が良い。さらに、A法の生育菌体法では目的とする一次（加水分解）反応に次いで二次反応が起こりやすく、B法の菌体懸濁法では微生物反応が単純化され、目的物質のみを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト2g（湿菌体）を3gシヨ糖を含む20mlの水道水に懸濁し、0.5~2時間、28℃で回転振とう培養する。ついで適量の基質をメタノールなどの水溶性溶媒に溶かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始後1~2日間、反応の経時変化をTLOで確認し、基質残存の認められる場合には蔗糖1gを追加し、加水分解反応を終了させる。反応液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、A法およびB法において微生物の培養に供しうる培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達しうる。これらの培地には天然培地、半合成培地、合成培地

などがあるが、加水分解活性の高い菌体を得るためには、天然培地を用いるのが望ましい。天然培地の一例として、グルコース1~5%、ペプトン1~3%、酵母エキス0.05~0.5% pH6.5の組成の培地などがある。この場合、微生物種によつてはグルコースを蔗糖または麦芽糖、液糖など他の糖源に、ペプトン、酵母エキスも同様に、大豆粉、ファーマメデアなど他の窒素源にかえることもできる。さらに炭素源、窒素源以外に無機塩（例えば  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  など）を0.001~0.01%添加することで、菌体の加水分解活性が高まることある。

一方、微生物菌体ではなく、酵素のみを用いても、目的を達成することができる有効な酵素は、微生物ないしは動物細胞由来のもので、リパーゼを始めとするエステラーゼやアミノアシラーゼなどであり、これらによる反応では、加水分解が立体選択的に進行するものが多い。例えば、エステラーゼ（Carboxylic-ester hydrolase, EC 3.1.1.1, 例えばブタ肝臓由来の市販品、PLE）

リパーゼ（Triacylglycerol acylhydrolase, EC 3.1.1.3, 例えば *Aspergillus oryzae* または *Aspergillus niger* 由来の市販品）

アミノアシラーゼ（N-Amino-acid aminohydrolase, EC 3.5.1.14, 例えば *Aspergillus* 属の糸状菌より調製された市販品）

などの酵素である。また、精製されたこれら標品のかわりに、市販品として安価に入手可能な粗精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼOは *Aspergillus oryzae* 由来の粗酵素標品で、リパーゼを含んでいるので精製標品のリパーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法に比べて培養のための装置や操作が不要であり、反応時に一次（加水分解）反応以外の反応がほとんど起こらず、微生物菌体由来の夾雑物もないため目的物質の抽出精製が容易である点などの利点がある。

例えば、ブタ肝臓エステラーゼ（PLE）500単

位を pH 8.0 の緩衝液（例えば磷酸緩衝液）50 ml に溶かし、水とよく混和する溶媒（例えばアルコール、ジメチルホルムアミドなど）少量に溶かした適量の基質を添加し、攪拌しながら 35℃ にて 2～24 時間反応させる。反応の経時変化を TLC で確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、粗生物が得られる。


基質は溶媒に溶かして添加するほか、直接投入する方法もある。いずれにおいても、必要に応じて 0.01~0.1 % の界面活性剤（例えば Triton X-100, Span 80 など）や水を混和する有機溶媒（例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトンなど）を適量添加することにより酵素反応をより効率的に行うことができる。

一般式(2)(式中、 $R^2$ および $R^3$ は前述したものと同意義を示す)を有する化合物は、以下のようにして得られる一般式(1)を有する化合物をアルコール、アセトンもしくはジメチルホルムアミドに溶かすか、または直接微生物の培地また

式中  $R^1$ 、 $R^2$  および  $R^3$  は前述したものと同意義を示し、 $X$  はハロゲン原子などを示す。

化合物(3)を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシッフの塩基(4)ができる。これとジケテンの反応により化合物(5)が得られる。これを還元し化合物(6)としてこれをアシル化することにより化合物(1)が得られる。


本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルバベネムへ導くことができる。



### Scheme 2

は酵素液に添加して、微生物反応においてはA法もしくはB法により1~4日間、酵素法においては2~24時間反応させる。この間、TLCなどにより化合物(1)の化合物(2)への変換を確認する。適当時間後、適当な溶媒、例えば酢酸エチル、エーテルなどの溶媒で抽出し、抽出物をカラムクロマトグラフィー、TLC、または再結晶法などにより、目的とする光学活性なアセチルノン誘導体(2)を分離精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特願昭59-265962号に開示された方法により得られる。すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から4工程で(1)が得られる





Scheme 1

すなわち化合物(7)の水酸基を保護しついでアセチレンのチオフエニル化をすると化合物(8)が得られる。化合物(8)の窒素原子の保護基を T Fukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc., 102 2122 (1980)) の方法に従つて除去しついで特開昭 60-19763 号の方法により化合物(9)が得られる。化合物(9)からカルバベネム(10)へ導く方法は特開昭 59-46265 号及び特開昭 59-51286 号に示されている。

つぎに実施例および参考例をあげて本発明を説明する。

### 实施例 1


$$d\epsilon - 3, 4\text{-トランス-1-(4-メトキシフエニル)} - 3\alpha - [(1R^*) - 1\text{-アセトキシエチル}]$$




—4—エチニル—2—アゼチジノン (60mg) を *Pichia farinosa* SANK 58062 (IAM 4303) と共に B 法により 30℃ で 24 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生績体 (76mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1、U.V ランプ検出、 $R_f = 0.32$ ) により精製すると目的化合物 21mg が得られた。

$$[\alpha]_D^{24} -135^\circ \quad (O=1, CHCl_3)$$

NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm : 1.27 (3H, d,  $J=6$ Hz), 2.55 (1H, d,  $J=2$ Hz), 3.38 (1H, dd,  $J=2$  及び 4 Hz), 3.75 (3H, s), 4.1~4.5 (1H, m), 4.60 (1H, t,  $J=2$ Hz), 6.75~7.60 (4H, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 型)

## 実施例 2

(3R, 4R) — 1 — (4—メトキシフェニル) — 3 — [(1R)—ヒドロキシエチル] — 4—エチニル—2—アゼチジノン



dl-3, 4—トランス—1—(4—メトキシフェニル)—3 $\alpha$ —[(1R\*)—1—ベンゾイルオキシエチル]—4—エチニル—2—アゼチジノン (500mg) を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069) と共に A 法により 28℃ で 24 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生績体 (518mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1) により精製すると目的化合物 148mg が得られた。このものをエーテルから再結晶を行った。

$$[\alpha]_D^{24} -200^\circ \quad (O=1, CHCl_3)$$

mp 133°

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

## 実施例 4

(3S, 4S) — 1 — (4—メトキシフェニル) — 3 — [(1R)—ヒドロキシエチル] — 4—エチニル—2—アゼチジノン

dl-3, 4—トランス—1—(4—メトキシフェニル)—3 $\alpha$ —[(1S\*)—1—アセトキシエチル]—4—エチニル—2—アゼチジノン (60mg) を実施例 1 と同様に反応、処理すると目的化合物 13mg が得られた。

$$R_f = 0.32 \quad (\text{シクロヘキサン/酢酸エチル} = 1/1)$$



$$[\alpha]_D^{24} +77^\circ \quad (O=1, CHCl_3)$$

mp 95~105°

NMR (ODCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm : 1.37 (3H, d,  $J=6$ Hz), 2.55 (1H, d,  $J=2$ Hz), 3.40 (1H, dd,  $J=2, 4$ Hz), 3.75 (3H, s), 3.9~4.4 (1H, m), 4.45 (1H, t,  $J=2$ Hz), 6.75~7.6 (4H, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>)

## 実施例 3

(3S, 4S) — 1 — (4—メトキシフェニル) — 3 — [(1R)—1—ヒドロキシエチル] — 4—エチニル—2—アゼチジノン




dl-3, 4—トランス—1—(4—メトキシフェニル)—3 $\alpha$ —[(1R\*)—1—ベンゾイルオキシエチル]—4—エチニル—2—アゼチジノン (120mg) を *Aspergillus niger* SANK 13658 (ATCC 9142) と共に A 法により 28℃ で 48 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生績体 (108mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1) により精製すると目的化合物 21mg が得られた。

$$[\alpha]_D^{24} -87^\circ \quad (O=1, CHCl_3)$$

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

## 実施例 5.

(3R, 4R) - 1 - (4-メトキシフェニル)  
- 3 [ (1R) - ヒドロキシエチル ] - 4 - エ  
チニル - 2 - アゼチジノン




dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4-メトキシフェニル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ベンゾイルオキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン (128 ㍉) を *Bacillus subtilis* SANK 76569 (IAM 1069) と共に A 法により 28℃ で 36 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生液体 (219 ㍉) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1) により精製すると目的物 10 ㍉が得られた。このものをエーテルにより再結晶を行つた。

$[\alpha]_D^{24} + 17.0^\circ$  (C=1,  $\text{CHCl}_3$ )

NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ ppm: 1.24 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.39 (1H, d,  $J=2\text{Hz}$ ), 3.22 (1H, dd,  $J=2, 5\text{Hz}$ ), 3.70 (3H, s), 3.9~4.4 (1H, m), 3.95 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 4.59 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 6.70~7.25 (4H,  $\text{A}_2\text{B}_2$  型)

## 実施例 7.

(3R, 4R) - 1 - (4-メトキシベンジル)  
- 3 - [ (1R) - 1 - ヒドロキシエチル ] - 4  
- エチニル - 2 - アゼチジノン




dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4-メトキシベンジル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ホルミルオキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン (188 ㍉) を *Pichia farinosa* SANK 58062 (IAM 4303) と共に B 法により 28℃ で 48 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出

mp 128°

## 実施例 6.

(3R, 4R) - 1 - (4-メトキシベンジル)  
- 3 - [ (1R) - 1 - ヒドロキシエチル ] - 4  
- エチニル - 2 - アゼチジノン



dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4-メトキシベンジル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ベンゾイルオキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン (80 ㍉) を *Bacillus subtilis* SANK 76759 と共に A 法により 28℃ で 48 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生液体 (164 ㍉) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1, UV ランプ検出,  $R_f=0.22$ ) により精製すると目的化合物 10 ㍉が得られた。

$[\alpha]_D^{25} - 19.5^\circ$  (C=1,  $\text{CHCl}_3$ )


して得られる粗生液体 (179 ㍉) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1) により精製すると目的化合物 13 ㍉が得られた。

$[\alpha]_D^{24} - 8^\circ$  (C=1,  $\text{CHCl}_3$ )

NMR は実施例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

## 実施例 8.

(3R, 4R) - 1 - (4-メトキシフェニル)  
- 3 - [ (1R) - 1 - ヒドロキシエチル ] - 4  
- エチニル - 2 - アゼチジノン





dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4-メトキシフェニル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ホルミルオキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン (38 ㍉) を *Pichia farinosa* SANK 58062 (IAM 4303) と共に B 法により 28℃ で 48 時間振とう

う培養する。培養液を実施例1と同様に処理すると目的化合物5 ㍉が得られた。

$$[\alpha]_D^{24} -120^\circ \text{ (C=0.5, CHCl}_3 \text{)}$$

NMRは実施例1で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 9.





dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - アセトキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン (31 ㍉) を *Pichia farinosa* SANK 58062 (IAM 4303) と共に A 法により 28 °C で 48 時間培養する。培養液を実施例6と同様に処理すると目的化合物4 ㍉が得られた。

$$[\alpha]_D^{24} -16^\circ \text{ (C=0.4, CHCl}_3 \text{)}$$

$$[\alpha]_D^{24} -123^\circ \text{ (C=1, CHCl}_3 \text{)}$$

NMR (ODCl<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>: 1.35 (3H, d, J=6Hz), ~2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, J=8Hz), 4.75 (1H, d, J=2.5Hz), 6.6 ~ 7.6 (9H, m)



実施例 11.



dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ベンゾイルオキシエチル ] - 4 - フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン (160 ㍉) を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069) と共に 1 日おきに 1 % のブドウ糖を添加しながら A 法に

NMRは実施例6で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 10.





dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシフェニル) - 3α - [ (1R\*) - 1 - ベンゾイルオキシエチル ] - 4 - フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン (110 ㍉) を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069) と共に A 法により 28 °C で 3 日間培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生体 (138 ㍉) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1, R<sub>f</sub> ≈ 0.5) により精製すると目的化合物 22 ㍉が得られた。

より 28 °C で 4 日間培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生体 (92 ㍉) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1, UV ランプ検出, R<sub>f</sub> ≈ 0.4) により精製すると目的化合物 13 ㍉が得られた。

$$[\alpha]_D^{24} -54^\circ \text{ (C=1, CHCl}_3 \text{)}$$

NMR (ODCl<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>: 1.28 (3H, d, J=6.5 Hz), ~2.4 (1H, s), 3.71 (3H, s), 3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz), 4.07 (1H, d, J=15Hz), 4.60 (1H, d, J=15Hz), 4.0 ~ 4.3 (1H, m), 4.28 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

実施例 12.



d<sub>l</sub>-3,4-トランス-1-アリル-3α-  
[ (1R\*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-  
4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン  
(520 ㎎) を *Bacillus subtilis* SANK 76759  
(IAM 1069) と共に A 法により 28℃ で 3 日間  
培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得ら  
れる粗生液体 (250 ㎎) をシリカゲル薄層クロ  
マトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル  
= 1/1, R<sub>f</sub> ≈ 0.4) により精製すると 目的化合  
物 43 ㎎ が得られた。


$$[\alpha]_D^{24} -3^{\circ} \quad (O=1, OHOL_3)$$

NMR (ODOL<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>: 1.29 (3H, d, J=6Hz),  
3.31 (1H, dd, J=2.5, 5Hz), 3.4~4.4  
(2H, m), 4.47 (1H, d, J=2.5Hz),  
4.9~6.0 (4H, m), 7.1~7.5 (5H, m)

## 実施例 13

(3B, 4B)-1-ペンツヒドリル-3-  
[ (1R)-ヒドロキシエチル]-4-エチニ  
ル-2-アゼチジノン

-2-アゼチジノン




d<sub>l</sub>-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3α-[ (1R\*)-1-ベンゾイルオキシエ  
チル]-4-エチニルアゼチジノン (40 ㎎)  
を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069)  
と共に 28℃ で 3 日間培養する。培養液を実施  
例 13 と同様に処理すると 目的化合物 10 ㎎ が得  
られた。

$$[\alpha]_D^{24} -52^{\circ} \quad (O=1, OHOL_3)$$

NMR は参考例 6 で得られた S\* 化合物のそれ  
と一致した。

## 実施例 15

(3B, 4B)-1-ペンツヒドリル-3-  
[ (1R)-ヒドロキシエチル]-4-フェニル  
チオエチニル-2-アゼチジノン




d<sub>l</sub>-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3α-[ (1R\*)-1-ベンゾイルオキシエチル]  
-4-エチニル-2-アゼチジノン (90 ㎎)  
を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069)  
と共に A 法により 28℃ で 3 日間培養する。培  
養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生液体  
(110 ㎎) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー  
(シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1, R<sub>f</sub>  
≈ 0.35) により精製すると 目的化合物 9.4 ㎎ が  
得られた。

$$[\alpha]_D +2.8^{\circ} \quad (O=0.94, OHOL_3)$$

NMR は参考例 6 で得られた化合物のそれと一  
致した。

## 実施例 14

(3B, 4B)-1-ペンツヒドリル-3-  
[ (1R)-ヒドロキシエチル]-4-エチニル




d<sub>l</sub>-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル-  
3α-[ (1R\*)-1-ベンゾイルオキシエチル]  
-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジ  
ノン (160 ㎎) を実施例 13 と同様に培養、処理  
すると 目的化合物 6.5 ㎎ が得られた。

$$[\alpha]_D -13^{\circ} \quad (O=0.65, OHOL_3)$$

NMR (ODOL<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>: 1.28 (3H, d, J=6Hz),  
~2.8 (1H, s), 3.35 (1H, dd, J=3,  
5Hz), 4.2 (1H, m), 4.34 (1H, d,  
J=3Hz), 6.04 (1H, s), 7.2~7.4  
(15H, m)

## 実施例 16

3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニ  
ル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-  
カルボキシメチル-2-アゼチジノン




dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-カルボキシメチル-2-アゼチジノン 50 mg を *Bacillus subtilis* SANK 76759 (IAM 1069) と共に A 法により 36 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生成体 (50 mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/5,  $R_f \approx 0.1$ , UV ランプ検出) により精製すると光学活性な目的化合物 5 mg が得られた。

実施例 17.

3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-ベンジルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン


フェニルチオカルボニルメチル-2-アゼチジノン



dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-フェニルチオカルボニルメチル-2-アゼチジノン 20 mg を *Bacillus subtilis* SANK 76759 と共に A 法により 36 時間培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生成体 25 mg をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1,  $R_f \approx 0.4$ , UV ランプ検出) により精製すると光学活性な目的化合物 5 mg が得られた。

実施例 19.


(38, 48) - 1 - (4-メトキシフェニル) - 3 - [(1R) - 1-ヒドロキシエチル] - 4-エチニル-2-アゼチジノン



dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-カルボキシメチル-2-アゼチジノン 80 mg を N, N-ジメチルホルムアミド中、炭酸水素ナトリウムの存在下ベンジルブロマイドと常法に従つて反応、処理するとベンジルエステル体 90 mg が得られる。この化合物 90 mg を *Bacillus subtilis* SANK 76759 と共に A 法により培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生成体 (90 mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1,  $R_f \approx 0.5$ , UV ランプ検出) により精製すると光学活性な目的化合物 20 mg が得られた。

実施例 18.

3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-



アミノアシラーゼ (N-Acylaminoacid aminohydrolase EC 3.5.1.14) 500 単位を  $5 \mu\text{g}/\text{ml}$  の塩化コバルトを含む蒸留水またはリン酸緩衝液 (PH 7.0) 50 ml に溶かす。これに dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-[(1R\*)-アセトキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン 49 mg を 0.05 % の Triton 100 とともに加える。この溶液を 30℃ で 2 日間搅拌する。反応液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生成体を実施例 1 と同様に処理すると目的化合物 10 mg が得られた。


$[\alpha]_D^{25} -40^\circ$  ( $c=1$ ,  $\text{CHCl}_3$ )

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 20.

(38, 48) - 1 - (4-メトキシフェニル)

— 3 — [ ( 1R ) — 1 — ヒドロキシエチル ] —  
4 — エチニル — 2 — アゼチジノン



ブタ肝臓由来のエステラーゼ ( Carboxylic-  
ester hydrolase EC 3.1.1.1 ) 500 単位を 0.1 M  
リン酸緩衝液 ( PH7.0 ) に溶かし、これに dl-  
3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-  
3α-[ ( 1R\* ) — 1 — アセトキシエチル ]  
— 4 — エチニル — 2 — アゼチジノン 60 mg を加  
え、ついでアセトンを加えアセトンの 5 % 水溶  
液とする。この溶液を 35℃ で 1 日間 攪拌する。  
反応液を実施例 1 と同様に処理すると目的化合  
物 12 mg が得られた。

$[\alpha]_D^{22} - 85^\circ$  (  $C=1$ ,  $CHCl_3$  )


NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一  
致した。

4.24 ( 1H, d,  $J=2\text{Hz}$  ), 4.54 ( 1H, t,  
 $J=2\text{Hz}$  ), 4.95 ~ 6.15 ( 3H, m )

IR (Liq.)  $\text{cm}^{-1}$  : 1760, 1712, 2110

#### 参考例 2


dl-1-ベンツヒドリル-3-アセチル-  
4-エチニル-2-アゼチジノン



プロパルギルアルデヒド 1 g を無水ベンゼン  
20 ml に溶解し、2.82 g のベンツヒドリルアミ  
ン及び無水硫酸マグネシウム 2 g を加え 20 分  
間攪拌。ろ過後、溶媒を留去し、残渣を無水塩  
化メチレン 30 ml に溶解し、1.57 g のイミダゾ  
ールを加え窒素雰囲気下 -20℃ に冷却する。  
ついで 1.78 ml のジケテンを -20℃ ~ -10℃ で加  
え、ゆつくりと反応温度を 15℃ とする ( 約 1.5  
時間 )。20 ml の塩化メチレンを加え、反応液  
を水洗し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにて

#### 参考例 1

dl-1-アリル-3-アセチル-4-エチ  
ニル-2-アゼチジノン



プロパルギル アルデヒド 1 g を塩化メチレ  
ン 20 ml に溶解し、0.87 ml のアリルアミン 及び  
無水硫酸マグネシウム 4 g を加え、20℃, 20  
分間攪拌。ろ過後、ろ液にイミダゾール 1.56 g  
を加えて、窒素雰囲気下 -20℃ とし、ついでジ  
ケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約 1.5 時間かけて反応温度を 20℃ にする。反  
応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥。  
溶媒留去後、残渣をシリカゲルラビット・クロ  
マトグラフィー ( 塩化メチレン ) に付し、 $R_f$   
= 0.4 辺の目的化合物 691 mg を得た。

$B_p$  95 ~ 105° / 0.03 mm Hg ( 油浴温度 )

NMR (  $CDCl_3$  )  $\delta$  : 2.28 ( 3H, s ), 2.56

( 1H, d,  $J=2\text{Hz}$  ), 2.3 ~ 4.3 ( 2H ),

乾燥。溶媒留去後、残渣をシリカゲル ラビッ  
トクロマトグラフィー ( シクロヘキサン : 酢酸  
エチル = 3 : 1 ) により精製すると目的化合物  
3.2 g が得られた。

$R_f=0.35$  ( シクロヘキサン : 酢酸エチル =  
2 : 1 )

NMR (  $CDCl_3$  )  $\delta$  : 2.21 ( 3H, s ), 2.32

( 1H, d,  $J=2\text{Hz}$  ), 4.22 ( 1H,  $J=2\text{Hz}$  ),


4.45 ( 1H, t,  $J=2\text{Hz}$  ), 5.88 ( 1H, s ),

7.28 ( 10H, s )

IR (Liq.)  $\text{cm}^{-1}$  : 2120, 1760, 1720

#### 参考例 3

dl-3,4-トランス-1-アリル-3α-  
( 1-ヒドロキシエチル ) — 4 — エチニル — 2  
— アゼチジノン



dl-1-アリル-3-アセチル-4-エチ

ニル-2-アゼチジノン 400 ㍉をメタノール 5 ml に溶解し、氷冷下 86 ㍉の  $\text{NaBH}_4$  をゆつくり加え、同温にて 20 分間攪拌後酢酸エチルを加え希塩酸水を加え、有機層を水洗 3 回、無水  $\text{MgSO}_4$  にて乾燥後溶媒留去。得られる残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル = 1 : 1,  $R_f = 0.3$  近辺）により目的化合物 300 ㍉が得られた。

NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  : 1.25 ( 1.25H, d,  $J=6.5$  ), 1.29 ( 1.75H, d,  $J=6.5\text{Hz}$  ), 2.45 ( 1H, m ), 3.0 ~ 3.8 ( 4H, m ), 3.8 ~ 4.3 ( 3H, m ), 6.1 ( 3H, m ),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から  $R^*/s^* = 1/1.4$  であることが明らかとなつた。


なお本反応を  $\text{NaBH}_4$  の代りに  $\text{K}$ -セレクトライドを用いても同様な結果が得られた。

#### 参考例 4


dl-3,4-トランス-1-アリル-3 $\alpha$ -(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-エチニル-2-アゼチジノン

#### 参考例 5

dl-3,4-トランス-1-アリル-3 $\alpha$ -( (1 $R^*$ ) -ベンゾイルオキシエチル ) -4-フエニルチオエチニル-2-アゼチジノンおよび  
dl-3,4-トランス-1-アリル-3 $\alpha$ -( (1 $S^*$ ) -ベンゾイルオキシエチル ) -4-フエニルチオエチニル-2-アゼチジノン



ヘキサメチルジシラザン 626 ㍉をテトラヒドロフラン 10 ml に溶解し、氷冷下  $n$ -ブチルリチウムヘキサン液 ( 1.62 m モル / ml ) 2.4 ml を加える。そのまゝ 30 分間攪拌後  $-78^\circ\text{C}$  に冷却する。この溶液に参考例 4 で合成したベンゾイル体 (  $R^*$ ,  $S^*$  のまざり ) 917 ㍉の 10 ml テトラヒドロフラン溶液を加え、更に  $-78^\circ\text{C}$  にて一時攪拌する。ついで、*J. Am. Chem. Soc.*, **99**, 4405 (1977) の方法で合成したフエニルベンゼ



参考例 3 により得た  $S^* : R^* = 1.4 : 1$  の混合物のアルコール体 800 ㍉を 20 ml の無水テトラヒドロフランに溶解し、トリフエニルホスフィン 234 g 及び安息香酸 1 g を加える。この溶液に室温にてアソジカルボン酸ジエチル 933 ㍉を加え、そのまゝ 30 分間攪拌。酢酸エチルを加え水洗 2 回、 $\text{MgSO}_4$  にて乾燥。溶媒留去後シリカゲルラビッドクロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル = 5 : 1）により精製すると目的化合物 917 ㍉が得られた。

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.50 ( 1.25H, d,  $J=6.5\text{Hz}$  ), 1.54 ( 1.75H, d,  $J=6.5\text{Hz}$  ), 2.54 ( 1H ), 3.3 ~ 3.8 ( 3H, m ), 3.9 ~ 4.4 ( 3H, m ), 4.9 ~ 6.1 ( 3H, m ), 7.2 ~ 7.6 ( 3H, m ), 7.8 ~ 8.1 ( 2H, m )

NMR の 1.50 と 1.54 のシグナルの比から  $R^*/S^* = 1/1.4$  であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート (  $\phi\text{SSO}_2\phi$  ) 972 ㍉の 10 ml テトラヒドロフラン溶液を加える。 $-78^\circ\text{C}$  にて一時攪拌。酢酸エチルを加えついで塩化アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出後、抽出液を飽和食塩水にて水洗。 $\text{MgSO}_4$  にて乾燥、溶媒留去後シリカゲルラビッドクロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル = 10 : 1）により精製し目的の  $R^*$  体 520 ㍉および  $S^*$  体 200 ㍉が得られた。

$R^*$  体：油状物質,  $R_f = 0.23$  ( 塩化メチレン )  
NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.52 (  $\text{CH}_3$ , d,  $J=6.5\text{Hz}$  ), 3.54 ( 1H, d, d,  $J=6.5, 2.5\text{Hz}$  ), 3.6 ~ 4.4 ( 2H, m ), 4.51 ( 1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$  ), 5.0 ~ 6.0 ( 4H, m ), 7.1 ~ 7.6 ( 8H, m ), 7.9 ~ 8.2 ( 2H, m )

IR (Liquid)  $\text{cm}^{-1}$  : 1760, 1720

$S^*$  体：mp  $70 \sim 1^\circ\text{C}$   $R_f = 0.31$  ( 塩化メチレン )


NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.55 (  $\text{CH}_3$ , d,  $J=6.5\text{Hz}$  ), 3.3 ~ 4.1 ( 3H, m ), 4.29 ( 1H, d,  $J=$

2.5Hz), 4.9 ~ 6.1 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m), 7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Nujol)  $\text{cm}^{-1}$ : 1760, 1720

#### 参考例 6.

dl-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3 $\alpha$ -(13\*)-1-ヒドロキシエチル)-  
4-エチル-2-アゼチジノン



参考例 2 の dl-1-ペンツヒドリル-3-アセチル-4-エチル-2-アゼチジノン 1.8 g を 30 ml のメタノールに溶解し、-20℃にて  $\text{NaBH}_4$  250 mg を加え同温にて 5 分間撹拌。希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸エチル抽出。水洗後、 $\text{MgSO}_4$  にて乾燥。溶媒留去後、シリカゲルラビットクロマトグラフィー（シクロヘキサン／酢酸エチル=1/1）により精製すると目的化合物 1.7 g が得られた。

参考例 6 で得た  $R^*$  及び  $S^*$  のまざりのアルコール体 1 g をピリジン 5 ml 及び無水酢酸 5 ml に溶解し 15 時間放置。酢酸エチルエステルを加え、希塩酸水、及び飽和食塩水にて洗滌後、溶媒留去。残渣をシリカゲルラビットクロマトグラフィー（塩化メチレン：酢酸エチル=40:1）により精製すると目的の  $S^*$  体 400 mg および  $R^*$  体 250 mg が得られた。

$S^*$  体: mp 123°.

$R_f$  = 0.64 (塩化メチレン：酢酸エチル = 20:1)

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$ : 1.35 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 1.88 ( $\text{CH}_3$ , s), 2.40 (1H, d,  $J=2\text{Hz}$ ), 3.40 (1H, t,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 3.74 (1H, t,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 5.13 (1H, dq,  $J=6.5, 3\text{Hz}$ ), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Nujol)  $\text{cm}^{-1}$ : 1770, 1735, 1600

$R^*$  体: 油状物

$R_f$  = 0.45 (塩化メチレン：酢酸エチル = 20:1)  
NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$ : 1.30 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ),


これをジエチルエーテルから再結晶すると目的化合物 600 mg が結晶として得られた。

mp 105°

NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.29 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.32 (1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 3.26 (1H, dd,  $J=5, 2.5\text{Hz}$ ), 3.89 (1H, t,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 3.8 ~ 4.2 (1H, m), 5.93 (1H, s), 7.1 ~ 7.4 (10H, m)

#### 参考例 7.

dl-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3 $\alpha$ -(1 $R^*$ )-アセトキシエチル)-4  
-エチル-2-アゼチジノン および dl-3,4  
-トランス-1-ペンツヒドリル-3 $\alpha$ -(1  
1 $S^*$ )-1-アセトキシエチル)-4-エチニ  
ル-2-アゼチジノン




1.92 (3H, s), 2.38 (1H, d,  $J=2\text{Hz}$ ), 3.36 (1H, dd,  $J=2.5, 5.5\text{Hz}$ ), 4.01 (1H, t,  $J=2\text{Hz}$ ), 5.14 (1H, q,  $J=5.5\text{Hz}$ ), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.)  $\text{cm}^{-1}$ : 1770, 1740

#### 参考例 8.

dl-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3 $\alpha$ -(1 $R^*$ )-1-ベンゾイルオキシエ  
チル)-4-エチル-2-アゼチジノン およ  
び dl-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル  
-3 $\alpha$ -(1 $S^*$ )-1-ベンゾイルオキシエ  
チル)-4-エチル-2-アゼチジノン



参考例 8 で得た 592 mg のアルコール体 ( $R^*$  及び  $S^*$  のまざり) を、10 ml のテトラヒドロフランに溶解し、1.05 g のトリフェニルホスフィ



ン及び440 mの安息香酸を加える。

この溶液に氷冷下アゾジカルボン酸ジエチル417 mgを加え、氷冷剤をとりのぞきそのまま10分間攪拌。酢酸エチルを加え、水洗3回。 $MgSO_4$ にて乾燥後溶媒留去し、残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル＝10：1）により精製すると目的のR\*体348 mgおよびS\*体117 mgが得られた。

R\*体：mp 111°

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1.45 (3H, d, J=6Hz), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, dd, J=2.5及び6Hz), 4.15 (1H, t, J=2Hz), 5.41 (1H, q, J=6Hz), 5.94 (1H, s), 7.1～7.5 (13H, m), 7.7～7.95 (2H, m)

S\*体：油状物

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1.50 (3H, d, J=6Hz), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=2.5Hz), 3.86 (1H, t, J=2.5Hz),

参考例8で合成したR\*のベンゾイル体348 mgのテトラヒドロフラン溶液を加える。1時間-78℃で攪拌後270 mgのフェニルベンゼンチオスルホネートを加え、-78℃にて30分攪拌後、酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加える。有機層を水洗後 $MgSO_4$ にて乾燥。溶媒留去後、残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル＝5：1）により精製すると目的のR\*体370 mgが得られた。

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1.46 (3H, d, J=6Hz), 3.61 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.42 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.06 (1H, s), 7.15～7.7 (13H, m), 7.8～8.0 (2H, m)

IR (Liquid)  $cm^{-1}$  : 1760, 1720, 1600, 1580


参考例8で得られたS\*ベンゾイル体86 mgを用いてR\*ベンゾイル体の場合と同様に反応、処理すると目的のS\*体90 mgが得られた。

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d,

5.44 (1H, dq, J=6, 2.5Hz), 5.90 (1H, s), 7.1～7.5 (13H, m), 7.7～7.96 (2H, m)

参考例9.

d $\delta$  - 3,4-トランス-1-ベンツヒドリル-3 $\alpha$ -[(1R\*)-ベンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノンおよびd $\delta$  - 3,4-トランス-1-ベンツヒドリル-3 $\alpha$ -[(1S\*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン




ヘキサメチルジシラザン0.22 mlを無水テトラヒドロフラン10 mlに溶解し、0.56 mlのn-ブチルリチウムヘキサン液(1.62モル/ml)を加え、30分間氷冷下攪拌する。-78℃に冷却し、

J=2.5Hz), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5Hz), 6.03 (1H, s), 7.1～7.6 (18H, m), 7.8～8.1 (2H, m)

参考例10.

d $\delta$  - 3,4-トランス-1-ベンツヒドリル-3 $\alpha$ -[(1R\*)-1-アセトキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノンおよびd $\delta$  - 3,4-トランス-1-ベンツヒドリル-3 $\alpha$ -[(1S\*)-1-アセトキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン



参考例7で得られたR\*体82 mgを用いて参考例9と同様に反応、処理すると目的のR\*体95 mgが得られた。

mp 120°

R<sub>f</sub> = 0.41 (塩化メチレン：酢酸エチル＝20：1)

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.30 ( 3H, d, J=6Hz ),  
1.93 ( 3H, s ), 3.39 ( 1H, dd, J=2.5,  
6Hz ), 4.20 ( 1H, d, J=2.5Hz ),  
5.16 ( 1H, q, J=6Hz ), 5.97 ( 1H, m ),  
7.0 ~ 7.4 ( 15H, m )

参考例 7 で得られた 8\* 体 140 ㎎ を用いて 参  
考例 9 と同様に反応、処理すると目的の 8\* 体  
110 ㎎ が得られた。

R<sub>f</sub> = 0.48 ( 塩化メチレン : 酢酸エチル = 20 : 1 )  
NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.38 ( 3H, d, J=6Hz ),  
1.92 ( 3H, s ), 3.45 ( 1H, t, J=2.5Hz ),  
3.99 ( 1H, d, J=2.5Hz ), 5.15 ( 1H, d, q  
J=6, 3Hz ), 5.99 ( 1H, s ), 7.1 ~ 7.5  
( 15H, m )

#### 参考例 11.

dl - 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メトキシ  
フェニル ) - 3α - [ ( 18\* ) - 1 - アセトキ  
シエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン  
および dl - 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メト  
キシフェニル ) - 3α - [ ( 1R\* ) - 1 - アセ

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.42 ( 3H, d, J=6.5Hz ),  
2.0 ( CH<sub>3</sub>, s ), 2.55 ( 1H, d, J=2Hz ),  
3.57 ( 1H, dd, J=5, 2.5Hz ), 3.76 ( 3H,  
s ), 4.31 ( 1H, t, J=2.5Hz ), 5.30  
( 1H, dq, J=6.5, 5Hz ), 6.7 ~ 7.6 ( 4H,  
A<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 型 )


R\* 体 : R<sub>f</sub> = 0.28 ( 塩化メチレン )

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.40 ( 3H, d, J=6.5Hz ),  
2.0 ( 3H, s ), 2.55 ( 1H, d, J=2Hz ),  
3.45 ( 1H, dd, J=6.5, 2Hz ), 3.76 ( 3H,  
s ), 4.50 ( 1H, t, J=2Hz ), 5.27 ( 1H,  
q, J=6.5Hz ), 6.7 ~ 7.6 ( 4H, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 型 )

#### 参考例 12


dl - 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メトキシ  
フェニル ) - 3α - [ ( 18\* ) - ベンゾイル オ  
キシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノ  
ンおよび dl - 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メ  
トキシフェニル ) - 3α - [ ( 1R\* ) - 1 - ベ  
ンゾイル オキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 -  
アゼチジノン

トキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジ  
ノン



参考例 1 および 2 の方法に準じて得られる dl  
- 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メトキシフェニ  
ル ) - 3α - ( 1 - ヒドロキシエチル ) - 4 -  
エチニル - 2 - アゼチジノン ( 特願昭 59-265962  
の参考例 12 に記載 ) 270 ㎎ ( R\* と S\* の 混  
合 物 ) を ピリジン 300 ㎎ 及び 無水酢酸 300 ㎎ に 溶  
解 し 15 時間 室温 に 放置 。 氷 水 に あけ、酢酸エ  
チル に て 抽出 。 希 塩 酸 水 及 び 水 洗 後 MgSO<sub>4</sub> に て  
乾燥 。 溶 媒 留 去 後 残 液 を シリカゲルラビッドク  
ロマトグラフィー ( 塩化メチレン ) に より 精 製  
す る と 目的 の S\* 体 85 ㎎ および R\* 体 180 ㎎ が  
得 ら れ た。

S\* 体 : R<sub>f</sub> = 0.34 ( 塩化メチレン )



参考例 1 および 2 の方法に準じて得られる dl  
- 3,4 - トランス - 1 - ( 4 - メトキシフェニ  
ル ) - 3α - ( 1 - ヒドロキシエチル ) - 4 -  
エチニル - 2 - アゼチジノン ( 特願昭 59-265962  
号 の 参考例 12 に 記載 ) を 分 別 再 結 晶 法 および  
母 液 の クロマトグラフィー に より 精 製 す る と 18\*  
- ヒドロキシエチル 体 ( 再 結 晶 法 ) および 1R\*  
- ヒドロキシエチル 体 ( クロマト法 ) が 得 ら れ  
た。

こゝ に 得 ら れ た 18\* - ヒドロキシエチル 体  
570 ㎎ を 無 水 テトラヒドロフラン 20 ml に 溶 解。  
更 に トリフェニルホスフィン 1.1 g 及 び 安 息 香  
酸 500 ㎎ を 加 え、氷 冷 下 700 ㎎ の アソジカルボ  
ン 酸 ジエチル を 加 え る。寒 剤 を のぞき、室 温 に  
て 3 時 間 攪 拌。減 圧 下 溶 媒 を 留 去 し、残 渣 を シ  
リカゲルラビッドクロマトグラフィー ( シクロ

ヘキサン：酢酸エチル＝5：1）により精製すると目的のR\*体500mgが得られた。

mp 101°（エーテルから再結晶）

R<sub>f</sub>＝0.5（塩化メチレン）

NMR（ODO<sub>2</sub>）δ：1.55（3H, d, J＝6.5Hz）, 2.55（1H, d, J＝2.5Hz）, 3.6（1H, dd, J＝6.5, 2.5Hz）, 3.70（3H, s）, 4.6（1H, t, J＝2.5Hz）, 5.46（1H, q, J＝6.5Hz）, 6.7～7.6（7H, m）, 7.8～8.0（2H, m）

IR（Nujol）cm<sup>-1</sup>：3280, 2140, 1745, 1720, 1608, 1590

1s\*－ヒドロキシエチル体500mgを無水塩化メチレン中25当量のトリエチルアミン及び触媒量のジメチルアミノピリジンの存在下25当量の安息香酸クロリドと10時間～15時間反応させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。有機層を希塩酸水にて二度洗滌後、水洗。MgSO<sub>4</sub>にて乾燥後溶媒留去すると目的のs\*体500mgが得られた。


で氷冷下150mgのアゾジカルボン酸ジエチル150mgを加える。反応液を室温にて5時間搅拌後、溶媒留去し残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル＝2：1, R<sub>f</sub>＝0.4）により精製すると目的化合物50mgが得られた。

mp 79℃（ジエチルエーテルから再結晶）

NMR（ODO<sub>2</sub>）δ：1.46（3H, d, J＝6.5Hz）, 2.54（1H, d, J＝2.5Hz）, 3.49（1H, dd, J＝6.5, 2.5Hz）, 3.74（3H, s）, 4.48（1H, t, J＝2.5Hz）, 5.38（1H, q, J＝6.5Hz）, 6.75～7.55（4H, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>型）, 7.98（1H, s）

#### 参考例14

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシベンジル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-エチニル-2-アゼチジノン




R<sub>f</sub>＝0.61（塩化メチレン）

NMR（ODO<sub>2</sub>）δ：1.59（3H, d, J＝6.5Hz）, 2.55（1H, d, J＝2.5Hz）, ～3.7（1H, s）, 3.70（3H, s）, 4.38（1H, t, J＝2.5Hz）, 5.53（1H, d, q, J＝6.5, 3Hz）

#### 参考例13

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-[(1R\*)-ホルミルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン



参考例12に示した方法で得られるdl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-[(1s\*)-1-ヒドロキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン100mgをテトラヒドロフラン3mlに溶解し、ぎ酸70mg及びトリフェニルホスフィン230mgを加える。つい


参考例1および2の方法に準じて合成されるdl-3,4-トランス-1-(4-メトキシベンジル)-3-アセチル-4-エチニル-2-アゼチジノン（特願昭59-265962の参考例4に記載）460mgをテトラヒドロフラン6ml及びメタノール3mlの混合液に溶解し、0℃にてNaBH<sub>4</sub>60mgを加える。10分後酢酸エチルを加え、さらに希塩酸水を加える。有機層を分離し、水洗後、MgSO<sub>4</sub>にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー（シクロヘキサン：酢酸エチル＝1：1, R<sub>f</sub>＝0.3）により精製すると目的化合物460mgが得られた。

NMR（ODO<sub>2</sub>）δ：1.24（1H, d, J＝6.0Hz）, 1.28（2H, d, J＝6.5Hz）, 2.39（1H, d, J＝2Hz）, 3.70（3H, s）, 3.2～3.4（1H, m）, 3.7～4.2（2H, m）, 4.59（1H, d, J＝15Hz）, 6.70～7.25（4H, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>型）

1.24と1.28のシグナルの比からR\*/s\*＝1/2であることが明らかとなった。

## 参考例 15.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシ  
ベンジル)-3 $\alpha$ -(1R\*)-1-ベンゾイ  
ルオキシエチル)-4-エチル-2-アゼチ  
ジノン



参考例 14 で得られた化合物 (R\* と S\* の混合物) 3 g を 80 ml の無水テトラヒドロフランに溶解し、6 g のトリフェニルホスフィン及び 2.8 g の安息香酸を加える。氷冷下 2.41 g のアジカルボン酸ジエチルを加え、5 分間撹拌する。反応液に酢酸エチルを加え有機層を水洗、MgSO<sub>4</sub> で乾燥後、溶媒留去して得られる残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン：酢酸エチル=4:1) により精製すると R\* と S\* の混合物 2.35 g が得られた。

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロマトグラフィーにより、塩化メチレンを展開溶

0.71 ml のヘキサメチルジシラザンをテトラヒドロフラン 10 ml に溶解し、氷冷下 n-ブチルリチウムヘキサン液 2.1 ml (1.62 m モル/ml) を加え 30 分間撹拌後、-78℃ に冷却する。この溶液に参考例 15 にて合成したベンゾイル体 (R\*, S\* のまざり) 1 g の 10 ml THF 溶液を加え、同温にて 1 時間撹拌する。ついでフェニルベンゼンチオスルホネート 7.67 g の 10 ml THF 溶液を加え更に 1 時間撹拌する。酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加え、有機層を分離する。水洗後 MgSO<sub>4</sub> にて乾燥。

溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン：酢酸エチル=10:1) により R\* 体及び S\* 体を分離精製すると

R\* 体：570 mg が得られた油状物質

R<sub>f</sub> = 0.46 (塩化メチレン：酢酸エチル=20:1)

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.45 (3H, d, J=6Hz),

3.54 (1H, dd, J=8, 2.5Hz), 3.72 (3H, s), 4.05 (1H, d, J=15Hz), 4.68 (1H, d, J=15Hz), 4.37 (1H, d, J=2Hz),


媒として用いる事により R\* を分離することが出来る。

R\* 体 :

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.43 (CH<sub>3</sub>, d, J=6Hz), 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=8, 2Hz), 3.73 (3H, s), 3.8 ~ 4.3 (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.6 ~ 7.6 (7H, m), 7.8 ~ 7.9 (2H, m)

## 参考例 16.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシ  
ベンジル)-3 $\alpha$ -(1R\*)-1-ベンゾイ  
ルオキシエチル)-4-フェニルチオエチル  
-2-アゼチジノンおよび 3,4-トランス-1  
-(4-メトキシベンジル)-3 $\alpha$ -(1S\*)  
-1-ベンゾイルオキシエチル)-4-フェニ  
ルチオエチル-2-アゼチジノン



5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)


S\* 体：180 mg が得られた。mp 85℃ (ジエチルエーテルから再結晶)

NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.54 (1H, d, J=6Hz), 3.5 ~ 3.8 (1H, m), 3.74 (3H, s), 4.0 (1H, d, J=15Hz), 4.72 (1H, d, J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), 6.5 ~ 7.7 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)

IR (Nujol) cm<sup>-1</sup> : 1755, 1732


## 参考例 17.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシ  
フェニル)-3 $\alpha$ -(1S\*)-1-ベンゾイ  
ルオキシエチル)-4-フェニルチオエチル  
-2-アゼチジノンおよび dl-3,4-トランス  
-1-(4-メトキシフェニル)-3 $\alpha$ -  
[(1R\*)-1-ベンゾイルオキシエチル)-  
4-フェニルチオエチル-2-アゼチジノン



ヘキサメチルジシラザン 0.4 ml を無水テトラヒドロフラン 10 ml に溶解し、氷冷下 1.18 ml の *n*-ブチルリチウムヘキサナート (1.62 m モル/ml) を加える。30 分間室温にて攪拌後  $-78^{\circ}\text{C}$  に冷却し、参考例 12 で得られた  $S^*$  ベンゾイルオキシ体 560 mg の無水テトラヒドロフラン溶液を加え、 $-78^{\circ}\text{C}$  で 1 時間攪拌する。ついでフェニルベンゼンチオスルホネート 430 mg の 5 ml テトラヒドロフラン溶液を加え、 $-78^{\circ}\text{C}$  にて 25 時間攪拌。酢酸エチルにて飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、有機層を分離する。水洗後  $\text{MgSO}_4$  にて乾燥。溶媒留去後、生成物をシリカゲルクロマトグラフィー (シクロヘキサン：酢酸エチル = 5 : 1,  $R_f = 0.3$ ) により精製すると目的の  $S^*$  体 630 mg が得られた。

$R_f = 0.4$  (塩化メチレン)



参考例 14 で得られた化合物 ( $R^*$  と  $S^*$  のまざり) 440 mg を無水テトラヒドロフランに溶解しトリフェニルホスフィン 890 mg 及びギ酸 0.2 mg を加える。氷冷下 354 mg のアゾジカルボン酸ジエチルを加え、10 時間室温にて攪拌。酢酸エチルを加え、有機層を水洗。  $\text{MgSO}_4$  にて乾燥後、溶媒留去。残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン：酢酸エチル = 1 : 1) により精製すると目的化合物 168 mg が得られた。

$R_f = 0.33$  (塩化メチレン：酢酸エチル = 40 : 1)

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.35 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.48 (1H, d,  $J=2\text{Hz}$ ), 3.33 (1H, dd,  $J=6, 2\text{Hz}$ ), 3.74 (3H, s), 3.90 (1H, t,  $J=2\text{Hz}$ ), 3.95 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 4.62 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 5.21 (1H, q,  $J=6\text{Hz}$ ), 6.6 ~ 7.3 (4H,  $A_2B_2$  型)。

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.59 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 3.70 (3H, s), ~ 3.7 (1H), 4.62 (1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 5.55 (1H, dq,  $J=6, 3.5\text{Hz}$ ), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

参考例 12 で得られた  $R^*$  ベンゾイルオキシ体を  $S^*$  ベンゾイルオキシ体と同様に反応、処理すると目的の  $R^*$  体を得られた。

$R_f = 0.28$  (塩化メチレン)

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.56 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 3.64 (1H, dd,  $J=8, 2.5\text{Hz}$ ), 3.72 (3H, s), 4.81 (1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 5.51 (1H, q,  $J=6\text{Hz}$ ), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liq.)  $\text{cm}^{-1}$  : 1750, 1712, 1600, 1580


参考例 18

$d_8$  - 3,4 - トランス - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3 $\alpha$  - [ (1 $R^*$ ) - 1 - ホルミルオキシエチル - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン

7.89 (1H, s)

参考例 19

$d_8$  - 3,4 - トランス - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3 $\alpha$  - [ (1 $R^*$ ) - 1 - アセトキシエチル ] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン



参考例 14 で得られた化合物 ( $R^*$  と  $S^*$  のまざり) 200 mg を用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン：酢酸エチル = 1 : 1) により精製すると目的化合物 200 mg が得られた。


$R_f = 0.56$  (シクロヘキサン：酢酸エチル = 1 : 1)

NMR ( $\text{ODCl}_3$ )  $\delta$  : 1.32 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 1.95 (3H, s), 2.45 (1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 3.32 (1H, dd,  $J=8, 2.5\text{Hz}$ ), 3.75 (3H, s), 3.92 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 4.70 (1H, d,  $J=15\text{Hz}$ ), 3.92 (1H, t,  $J=2.5\text{Hz}$ ),

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 ~ 7.3 (4H,  $A_2B_2$  型)

## 参考例 20.

1-(4-メトキシフェニル)-3-アセチル-4-(2,2-ジエトキシエチル)-2-アゼチジノン



ジエトキシプロピルアルデヒド 2 g をベンゼン 30 g に溶解し 1.68 g の p-アニシジン 及び 5 g の無水硫酸マグネシウムを加える。室温にて 20 分攪拌。ろ過後、減圧下溶媒留去する。残渣を塩化メチレン 20 ml に溶解し、これにイミダゾール 1.12 g を加える。全系を  $-30^\circ$  とし 1.25 ml のジケテンを加え、2 時間かかり反応温度を  $-30^\circ$  から  $10^\circ$  とする。


塩化メチレンを加え、水洗後  $MgSO_4$  にて乾燥。粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

フイー(酢酸エチル：シクロヘキサン=2:1)により精製すると目的化合物 463 mg が得られた。

NMR (ODCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm: 1.02 ~ 1.04 (9H, m), 1.55 ~ 2.60 (2H, m), 3.13 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 3.27 ~ 3.87 (5H, m), 3.82 ~ 4.32 (2H, m), 4.60 (1H, d, J=5.5Hz), 3.72 (3H, s), 6.7 ~ 7.3 (4H,  $A_2B_2$  型)

## 参考例 22

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3 $\alpha$ -(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-(2,2-ジエトキシエチル)-2-アゼチジノン




フイー(シクロヘキサン：酢酸エチル=3:1)により精製すると目的化合物 930 mg が得られた。

$R_f=0.45$  (シクロヘキサン：酢酸エチル=1:1)

NMR (ODCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.15 (3H, t, J=6.5Hz), 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H, m), 2.35 (COCH<sub>3</sub>, s), 3.4 ~ 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 ~ 4.85 (2H, m), 6.8 ~ 7.5 (4H,  $A_2B_2$  型)

## 参考例 21.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3 $\alpha$ -(1-ヒドロキシエチル)-4-(2,2-ジエトキシエチル)-2-アゼチジノン




参考例 20 で得られた化合物 600 mg をナトラヒドロフラン：メタノール=10:1の混合溶媒 15 ml に溶解し、 $-20^\circ$  にて 150 mg の  $NaBH_4$

参考例 21 で得られた化合物 230 mg を 1 ml の無水塩化メチレンに溶解し、ビリジン 0.2 ml ついで安息香酸クロリド 150 mg を加え 20 時間室温にて攪拌。反応液を常法に従って処理し得られる残渣をシリカゲルクロマトグラフイー(シクロヘキサン：酢酸エチル=2:1)により精製すると目的物 280 mg が得られた。

NMR (ODCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.80 (2.25H, d, J=6Hz), 1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), 5.25 ~ 5.75 (1H, m), 6.7 ~ 7.7 (7H, m), 4.69 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 ~ 8.25 (2H, m)

## 参考例 23

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3 $\alpha$ -(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-(2-ホルミルエチル)-2-アゼチジノン



参考例 22 で得られた化合物 260 ㎎を テトラ  
ヒドロフラン 8 ml と水 2 l の混合溶媒に溶かし、  
氷冷下 1 ml の濃塩酸を加える。2 時間攪拌後、  
酢酸エチルを加え、水洗。乾燥溶媒を留去して  
得られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフ  
イー (シクロヘキサン：酢酸エチル=1:1)  
により精製すると目的化合物 140 ㎎が得られた。


$R_f=0.3$  (酢酸エチル：シクロヘキサン=1:1)

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.56 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ),  
1.54 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.5 ~ 3.5 (3H,  
m), 3.72 (3H, s), 4.10 ~ 4.55 (2H,  
m), 5.4 ~ 5.8 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H,  
m), 7.7 ~ 8.0 (2H, m), 9.74 (1H, br,  
s)

#### 参考例 24

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシ  
フェニル)-3 $\alpha$ -(1-ベンゾイルオキシエ  
チル)-4-カルボキシメチル-2-アゼチジ  
ノン


チル)-4-フェニルチオカルボニルメチル-  
2-アゼチジノン



参考例 24 で得られた化合物 90 ㎎をジメチル  
ホルムアミド：アセトニトリル=1:1 の混合  
溶媒に溶解し、カルボニルジイミダゾライド  
60 ㎎を加え室温で 30 分間攪拌する。反応液に  
60 ㎎のチオフエノールを加え 2 時間攪拌する。  
反応液に酢酸エチルを加え、希水酸化ナトリウ  
ム水、水の順で洗う。乾燥後溶媒を留去して得  
られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフイ  
ー (シクロヘキサン：酢酸エチル=2:1  
 $R_f=0.3$ ) により精製すると目的物 70 ㎎が得ら  
れた。

#### 参考例 26

(3S, 4S)-1-(4-メトキシフェニル)



参考例 23 で得られた化合物 140 ㎎を アセト  
ン 2 ml に溶解し、ジョーンズ試薬 (100 ㎎) に  
より室温で 3 分間酸化する。反応液を酢酸エチ  
ルで抽出し、水洗、 $\text{MgSO}_4$  で乾燥する。溶媒を  
留去して得られる残渣をシクロヘキサン：酢酸  
エチル=1:1 の系にて分取用シリカゲル TLC  
に付し  $R_f=0.1$  近辺より目的化合物 91 ㎎が得ら  
れた。


NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.51 (1H, d,  $J=6\text{Hz}$ ),

1.54 (2H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.3 ~ 3.5 (3H,  
m), 3.70 (3H, s), 4.0 ~ 4.4 (2H, m),  
5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m),  
7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

#### 参考例 25

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシ  
フェニル)-3 $\alpha$ -(1-ベンゾイルオキシエ

-3-[ (1R)-1-ブチルジメチルシリル  
オキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジ  
ノン



実施例 3 により得た R 配位のハイドロキシエ  
チル体 90 ㎎を DMF 3 ml に溶解し、1-ブチル  
ジメチルシリルクロリド 160 ㎎及びイミダゾ  
ール 36 ㎎を加え 10 時間放置。酢酸エチルを加え、  
水洗。 $\text{MgSO}_4$  にて乾燥後、溶媒留去。シクロ  
ヘキサン：酢酸エチル=2:1 にて  $R_f=0.65$  の  
部分をクロマトグラフィーにより分離する。目  
的化合物 100 ㎎が得られた。


$[\alpha]_D^{24} -112^\circ$  (c=1, OHOL<sub>3</sub>)

NMR (ODOL<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.06 (6H, s), 0.76 (9H,  
s), 1.26 (3H, d,  $J=6\text{Hz}$ ), 2.47 (1H,  
d,  $J=2.5\text{Hz}$ ), 3.29 (1H, dd,  $J=3, 2.5\text{Hz}$ ),  
3.75 (3H, s), 4.27 (1H, dq,  $J=6, 3\text{Hz}$ ).

4.52 ( 1H, t,  $J=2.5\text{Hz}$  ), 6.75 ~ 7.55 ( 4H,  $\Lambda_2B_2$  型 )

参考例 27.

( 38, 48 ) - 1 - ( 4 - メトキシフェニル )  
- 3 - [ ( 1R ) - 1 - ブチルジメチルシリル  
オキシエチル ] - 4 - フェニルチオエチニル -  
2 - アゼチジノン



参考例 26 により得たシリル体 60 ㍉を無水テトラヒドロフラン 2 ㍉に溶解し、 $-78^\circ\text{C}$  にてブチルリチウム液 0.25 ㍉ ( 1 ㍉中 1.6 ミリモルブチルリチウム液を含むヘキサン液 ) を  $-78^\circ\text{C}$  にて加え 30 分撹拌。ジフェニルジスルフィド 75 ㍉の 1 ㍉テトラヒドロフラン液を加え、 $-78^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$  に 2 時間半撹拌。酢酸エチルを加え、有機層を水洗 3 回。 $\text{MgSO}_4$  にて乾燥後シクロヘキサン

液をゆつくり加える。10 分間撹拌。酢酸エチルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロヘキサン：酢酸エチル = 2 : 1 の系で  $R_f=0.54$  の部分を単離精製する。目的化合物 30 ㍉が得られた。

mp  $76^\circ$

$[\alpha]_D^{24} +46^\circ$  (  $c=1$ ,  $\text{CHCl}_3$  )

NMR (  $\text{CDCl}_3$  )  $\delta$  : 0.08 ( 6H, s ), 0.89 ( 9H, s ), 1.26 ( 3H, d,  $J=6\text{Hz}$  ), 3.40 ( 1H, br.t,  $J=3\text{Hz}$  ), 4.31 ( 1H, dq,  $J=6, 4\text{Hz}$  ), 4.59 ( 1H, d,  $J=2.5\text{Hz}$  ), 6.2 ( 1H, s ), 7.32 ( 5H, m )


ン：酢酸エチル 5 : 1 の系にてシリカゲル薄層クロマトグラフィーに付し  $R_f=0.55$  の目的化合物 38 ㍉が得られた。

NMR (  $\text{ODCl}_3$  )  $\delta$  : 0.08 ( 6H, s ), 0.76 ( 9H, s ), 1.30 ( 3H, d,  $J=6\text{Hz}$  ), 3.37 ( 1H, t,  $J=3\text{Hz}$  ), 3.74 ( 3H, s ), 4.3 ( 1H, dq,  $J=6, 3\text{Hz}$  ), 4.77 ( 1H, d,  $J=2\text{Hz}$  ), 6.7 ~ 7.5 ( 9H, m )

$[\alpha]_D^{24} -96^\circ$  (  $c=1$ ,  $\text{CHCl}_3$  )

参考例 28.

( 38, 48 ) - 3 - [ ( 1R ) - 1 - ブチルジ  
メチルシリルオキシエチル ] - 4 - フェニルチ  
オエチニル - 2 - アゼチジノン



参考例 27 で得たチオフェニル化体 60 ㍉を 2 ㍉のアセトニトリルに溶解し、氷冷下 240 ㍉のセリクアンモニウムナイトライトの 2 ㍉水溶

出願人 三 共 株 式 会 社  
代理人 弁理士 塚 出 庄 治